

Patientinformation	Opdateret 05.09.21	Doc. P-007.04	Af Ken Ninn-Pedersen	Ansvar Ken Ninn-Pedersen
--------------------	--------------------	---------------	----------------------	--------------------------

**Efterstær** er en uklarhed i øjets linsekapsel.

- Måneder til år efter operation for grå stær kan der udvikles en uklarhed i linsekapslen bag den kunstige linse. Synet forringes og behandling bliver nødvendig

### Er der forholdsregler før behandlingen?

- Behandlingsdagen kommer du i din letteste model hvis du anvender kørestol

### Hvordan behandles efterstær?

- Efterstær fjernes med laser (YAG-laser).
- Behandlingen er smertefri og varer ca. 5-10 minutter
- Inden behandling dryppes øjet med pupiludvidende dråber.
- Behandlingen foregår siddende, som ved almindelig øjenundersøgelse. Øjets overflade bedøves med øjendråber, og en kontaktlinse anbringes på øjet.
- Kontaktlinsen forhindrer blinkning og giver en forstørrelse for øjenlægen.
- Laserlyset danner en lille åbning i den uklare linsekapsel (efterstæren).

### Er der forholdsregler efter behandlingen?

Medicinen, som udvider pupillen virker ofte i op til 12 timer eller mere. Synet kan være sløret og skarpt lys kan blænde.

- For at forebygge komplikationer anvendes øjendråber Voltaren 3 gange dagligt i det behandlede øje i en uge fra dagen efter behandlingen
- Kør ikke selv bil hjem efter behandlingen
- Husk solbriller

### Er der gener eller komplikationer i forbindelse med behandlingen?

- Efter behandlingen kan der opstå lette smerter og øjet kan blive rødt.
- Sjældent ses hævelse på den gule plet i nethinden eller nethindeløsning

**Ved spørgsmål vedr. behandlingen ring hverdage 9-12 på telefon 36491200**